

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO: TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA

Nombre del paciente:

Nombre del proveedor:

Institución / Contacto:

Diagnóstico (marque uno):

	Puntuación 4T (ingrese valor: 0-8; ver tabla)
	TIH definida
	TIH posible/probable

Fecha de diagnóstico:

¿Coagulo presente? Marque: SI NO

¿Tratamiento de coagulo?

Recuento de plaquetas antes de la heparina (si se conoce):

Plaquetas: Fecha:

Nadir del recuento de plaquetas (valor más bajo):

Plaquetas: Fecha:

Recuperación del recuento de plaquetas (primer día > 150 x 10⁹):

Plaquetas: Fecha:

Prueba de laboratorio de confirmación (marque todas las que correspondan):

	Elisa heparina-PF4
	Ensayo de agregación plaquetaria inducida por heparina
	Ensayo de liberación de serotonina plaquetaria

Fecha de prueba anterior:

Historia de exposición a heparina:

	Heparina no fraccionada
	HPBM:

Fecha de primera dosis de heparina: Dosis:

Fecha de última dosis de heparina: Dosis:

Tratamiento:

Anticoagulante alternativo usado:

Fechas: Dosis:

Anticoagulante oral:

Fechas: Dosis:

Meta INR: Siguiete INR:

Test de Probabilidad de trombocitopenia inducida por heparina (4T)

Puntaje	2	1	0
Trombocitopenia	Caída del recuento de plaquetas > 50% y nadir de plaquetas $\geq 20 \times 10^9$	Caída del recuento de plaquetas 30% - 50% o nadir de plaquetas $10-19 \times 10^9/L$	Caída del recuento de plaquetas <30% o nadir de plaquetas $<10 \times 10^9/L$
Tiempo* de caída del recuento de plaquetas o trombosis u otras secuelas	inicio claro entre los días 5-14 o caída de plaquetas ≤ 1 día (exposición previa a heparina dentro de los 30 días)	Consistente con los días 5-14 de caída, pero no se aclara ni aparece después del día 14 o caída ≤ 1 día (exposición previa a heparina 30-100 días anteriores)	Caída del recuento de plaquetas ≤ 4 días sin exposición reciente a heparina
Trombosis u otra secuela clínica	Nueva trombosis; Necrosis cutánea; reacción anafilactoide después de heparina IV	Trombosis recurrente progresiva; lesiones cutáneas (eritematosas) no necrotizantes, sospecha de trombosis/no confirmada	Ninguno
Otra causa de trombocitopenia	Ninguna otra explicación	Posible otra causa evidente	Presencia de otra causa definida

Alta probabilidad: 6 a 8 puntos; probabilidad intermedia de 4 a 5; baja probabilidad 0 a 3

*El tiempo se refiere al primer día de exposición a la heparina.